

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PERIODIQUE
CPPAP N° 523 AD

EDITION DE LA STATION « ALSACE ET LORRAINE »

(BAS-RHIN, HAUT-RHIN, MEURTHE-ET-MOSELLE, MEUSE, MOSELLE, VOSGES)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

Cité Administrative - 67084 STRASBOURG CEDEX

Tél. (88) 61 49 50 Poste 457

DLP 23-8-80368796

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

ABONNEMENT ANNUEL 60 F

Régisseur de recettes D.D.A.

2, rue des Mineurs

67070 STRASBOURG CEDEX

C. C. P. STRASBOURG 5.508.00 F

Bulletin n° 29

26 août 1980

ARBRES FRUITIERS

- POIRIER -

PSYLLES DU POIRIER

De très nombreuses pontes sont à nouveau déposées sur les feuilles de l'extrémité des rameaux et les éclosions sont actives.

Sur les variétés hâtives en cours de récolte ou proches de l'être, intervenir dès la fin de la cueillette. Sur les autres variétés, ne plus utiliser l'amitraz et le monocrotophos dont les délais d'emploi avant la récolte sont trop longs (respectivement 30 et 42 jours). Utiliser de préférence la décaméthrine (pas de délai) ou la perméthrine (15 jours de délai).

Traiter dès réception.

- PRUNIER -

CARPOCAPSE DES PRUNES

Dans les rares zones de production de quetsches où une récolte pourra être effectuée (principalement dans le Sundgau), renouveler le traitement insecticide au cours de cette semaine.

CULTURES MARAICHÈRES

- POIREAU -

TEIGNE DU POIREAU

Le troisième vol a trouvé son maximum d'intensité dans la période du 17 au 24 août. Les dégâts causés par cette génération risquent d'être graves. En conséquence, réaliser un nouveau traitement insecticide avant le 30 août.

Bien tenir compte des délais d'emploi des produits avant la récolte.

VIGNE

OIDIUM

Cette maladie progresse en parcelles mal protégées.

Un renouvellement de la protection (par poudrage de préférence) est donc conseillé dans les prochains jours, les grappes restant sensibles aux attaques d'oïdium jusqu'à la véraison. Ce sera probablement le dernier traitement anti-oïdium pour la saison en cours.

TORDEUSES DE LA GRAPPE

L'abaissement des températures nocturnes noté depuis quelques jours, a freiné l'activité des papillons et les vols ont pratiquement cessé à partir du 22 août dans la plupart des secteurs. De manière générale, très peu de pontes ont été déposées depuis cette date. Il n'y a donc pas lieu, dans l'immédiat, de renouveler la protection insecticide.

Cependant, la situation reste à suivre, une reprise de vol étant encore possible. Notre prochain bulletin précisera, en fonction de l'évolution de la situation, la nécessité ou non de joindre un insecticide au traitement anti-botrytis prévu au début de la véraison et qui trouvera, cette année, tout son intérêt.

GRANDES CULTURES

- HOUBLON -

MILDIOU

Les risques de contamination par le mildiou persistent. Pour éviter des attaques parfois graves sur cônes, renouveler la protection fongicide dès que possible.

Ne pas omettre de traiter la variété Northern-Brewer dont la récolte ne sera pas achevée avant 8 jours.

OIDIUM

Maintenir la protection contre ce champignon dont le développement sur cônes est toujours à craindre. Dans certaines situations, on note, en effet, des taches plus ou moins nombreuses sur les feuilles de la base des lianes. Ajouter un anti-oidium à la bouillie anti-mildiou et bien mouiller l'ensemble de la végétation.

PUCERONS

Les attaques tardives de pucerons sur cônes sont souvent préjudiciables à la récolte. Actuellement, ces ravageurs sont présents dans bon nombre de parcelles. A l'approche de la récolte, il s'agit de rester vigilant. Surveiller particulièrement l'extrémité des lianes de houblon qui constituent les principaux foyers d'infestation.

Pour le choix de l'aphicide, tenir compte des délais d'emploi des produits avant la récolte.

REPONDEURS TELEPHONIQUES

- Secteur Alsace : (88) 60.30.10
- Secteur Lorraine : (8) 337.45.98.

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie, Chef de la
Circonscription Phytosanitaire
"ALSACE et LORRAINE"
J. HARRANGER